

## ARTIKEL PENELITIAN

### **Systematic Review: Efektivitas Siprofloxacin Topikal pada Pengobatan Otitis Media Supuratif Kronik**

**Anissha Fitry Oktavianita,<sup>1</sup> Lelly Yuniarti,<sup>2</sup> Tety H Rahim<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Otorhinolaringologi, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Muhammadiyah, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Biokimia, Nutrisi, dan Biomolekul, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam, Bandung, Indonesia

#### **Abstrak**

Otitis media supuratif kronik atau OMSK merupakan proses inflamasi kronik yang terjadi pada telinga bagian tengah yang diakibatkan oleh bakteri, ditandai dengan perforasi membran timpani serta *ottorhoea* yang terjadi secara terus menerus. Bakteri penyebab paling umum adalah *Pseudomonas aeruginosa*. Pengobatan OMSK dapat menggunakan antibiotik topikal siprofloxacin. Beberapa penelitian menunjukkan antibiotik topikal lebih efektif dibanding dengan antibiotik sistemik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas siprofloxacin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik. Penelitian ini merupakan *systematic review* dengan *database* yang digunakan adalah *Google Scholar*, *Science Direct*, *Proquest*, *Springer Link*, *Cochrane Library*, dan *EBSCO HOST* dengan jumlah artikel yang didapat sebanyak 599 artikel. Hasil skrining pada artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi sebanyak 344 artikel dan kriteria eksklusi sebanyak 340 artikel. Setelah dilakukan telaah kritis, artikel yang di-review sebanyak empat artikel. Penelitian dilakukan pada periode Maret–Desember 2020. Hasil telaah dan analisis dari empat artikel menunjukkan bahwa siprofloxacin topikal lebih efektif dibanding dengan topikal neomisin, framisetin gramicidin-deksametason (FGD), dan asam borik pada pengobatan otitis media supuratif kronik. Parameter kesembuhan gejala *ottorhoea*, perforasi membran timpani, serta kualitas pendengaran. Kesimpulan penelitian ini adalah siprofloxacin topikal efektif pada pengobatan otitis media supuratif kronik.

**Kata kunci:** Otitis media supuratif kronik (OMSK), *ottorhoea*, perforasi, siprofloxacin topikal

### **Systematic Review: Effectiveness of Topical Ciprofloxacin in the Treatment of Chronic Suppurative Otitis Media**

#### **Abstract**

Chronic suppurative otitis media or CSOM is an chronic inflammatory process that occurs in the middle ear, which is caused by bacteria with perforation of the tympanic membrane and the presence of *ottorhoea*. The most common causative bacteria is *Pseudomonas aeruginosa*. Topical antibiotic using ciprofloxacin can be used to treat for CSOM. Several studies have shown topical antibiotic to be more effective than systemic antibiotics. The aim of this study was to analyze the effectiveness of ciprofloxacin in the treatment of chronic suppurative otitis media. The study was conducted using systematic review method and database used in this study were Google Scholar, Science Direct, Proquest, Springer Link, Cochrane Library, and EBSCO HOST with 599 articles of journals obtained. The screening result on articles in accordance with the inclusion criteria were 344 articles and the exclusion criteria were 340 articles. The results of critical appraisal as many 4 articles. The study was conducted during March–December 2020. The results of review dan analysis from 4 articles of each study, topical ciprofloxacin was more effective topical neomycin, framycetin gramicidin-dexamethasone (FGD), and boric acid in the treatment of chronic suppurative otitis media. The parameters for relieving of symptomatic symptoms, perforation of tympanic membrane, and hearing quality. The conclusion of this study is that ciprofloxacin topical is more effective in the treatment of chronic suppurative otitis media.

**Keywords:** Chronic suppurative otitis media (CSOM), ciprofloxacin topical, *ottorhoea*, perforation

Received: 8 ...; Revised: ...; Accepted: ...; Published: ...

**Koresponden:** Anissha Fitry Oktavianita. Prodi Pendidikan Dokter. Fakultas Kedokteran, Univeristas Islam Bandung, Jln. Tamansari No.22, 40116, Kota Bandung, HP: 085220058423. E-mail: oktavianitaanisshaf@gmail.com

## Pendahuluan

Otitis media supuratif kronik atau OMSK merupakan proses peradangan pada telinga tengah yang diakibatkan oleh infeksi mukoperiosteum dengan perforasi membran timpani dan keluar sekret yang terjadi terus menerus ataupun hilang tiba-tiba yang dapat menyebabkan keadaan patologik yang permanen.<sup>1,2</sup> Sekitar 65–300 juta kasus terjadi di seluruh dunia dan 60% dari kasus mengalami gangguan pendengaran. Populasi dengan prevalensi OMSK tertinggi, yaitu penduduk asli Amerika yang disebut Inuit di Alaska, Kanada, Greenland, Indian Amerika, dan Aborigen Australia (7–46%). Prevalensi OMSK di negara lain seperti di Kepulauan Pasifik Selatan, Afrika, Korea, India, dan Arab Saudi (1–6%).<sup>3,4</sup>

Otitis media supuratif kronik merupakan komplikasi otitis media akut persisten dengan perforasi pada anak yang dapat terjadi tanpa atau dengan kolesteroloma dan tanpa kolesteroloma disebut OMSK tipe banigma, sedangkan OMSK yang disertai kolesteroloma disebut OMSK tipe maligna.<sup>2,5</sup> Sedangkan OMSK tipe maligna ditandai dengan invasi ke tulang dan mengakibatkan osteomielitis atau destruksi tulang.<sup>7</sup>

Patogen penyebab OMSK biasanya bakteri anaerob atau aerob.<sup>9</sup> Mikroorganisme aerob: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Streptococcus pyogenes*, *Mirabilis proteous*, *Klebsiella* spp, dan mikroorganisme anaerob: *Bacteroids*, *Peptostreptococcus*, dan *Propioni*. Jamur juga dapat menyebabkan OMSK, antara lain *Candida*, *Aspergilus*, *Penicillium*, dan *Rhizopus*.<sup>10</sup>

Patogenesis otitis media supuratif kronik masih kurang dipahami. Interaksi kompleks antara lingkungan, mikrob, dan inang diduga menjadi penyebab OMSK.<sup>4,6</sup> and can lead to thickening of the middle ear mucosa and mucosal polyps. It usually occurs as a complication of persistent acute otitis media (AOM). Biofilm bakteri juga dapat menjadi penyebab OMSK. Biofilm yang resisten terhadap antibiotik menyebabkan bakteri sulit untuk dihilangkan sehingga menyebabkan infeksi berulang. Sitokin yang terlibat dalam patogenesis otitis media, antara lain interleukin-8 (IL-8) yang berperan dalam pengembangan kronisitas otitis media dan pertumbuhan bakteri penyebab OMSK. Peningkatan sitokin lainnya, seperti *tumor necrosis factor alfa* (TNF- $\alpha$ ) dan interleukin-6 (IL-6) didapatkan di mukosa telinga tengah pasien OMSK yang dapat merusak jaringan serta perubahan otitis media akut menjadi kronik.<sup>3</sup>

Pengobatan otitis media supuratif kronik, di antaranya antiseptik topikal, antibiotik (topikal, oral, atau parenteral), atau operasi.<sup>11,12</sup> Tujuan pengobatan OMSK adalah membuat telinga menjadi kering yang menghilangkan gejala dan memungkinkan perbaikan membran timpani (terutama jika anak masih sangat muda).<sup>5</sup> Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik topikal lebih efektif dibandingkan antibiotik sistemik yang dapat dilihat berdasarkan atas keamanan terapi (efek samping) dan pencegahan infeksi. Penggunaan antibiotik sistemik digunakan apabila telah terjadi komplikasi pada otitis media supuratif kronik.<sup>2,13</sup> Antibiotik topikal yang sering digunakan salah satunya adalah siprofloxacin.<sup>2,14</sup> Siprofloxacin adalah jenis antibiotik golongan fluorokuinolon yang paling efektif terhadap

mikroorganisme bakteri gram negatif terutama *Pseudomonas aeruginosa*.<sup>15, 16,17</sup> Pada pasien dengan otitis media supuratif kronik diberikan siprofloxacin topikal sehari dua kali sebanyak dua tetes.<sup>18,19</sup> Tujuan systematic review ini adalah menilai secara sistematis efektivitas siprofloxacin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik.

## Metode

Fokus utama penelitian adalah efektivitas siprofloxacin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik.

Data diekstraksi melalui proses seleksi tiga tahap. Di tahap pertama, dilakukan pencarian data pada database *Google Scholar* dengan kata kunci ciprofloxacin AND (ear drop OR ototopical OR topical) AND “chronic suppurative otitis media” AND “randomized controlled trial”. Pada database *Science Direct* dan *Springer Link* menggunakan kata kunci ciprofloxacin AND (ear drop OR ototopical OR topical) AND chronic suppurative otitis media AND randomized controlled trial. Pada database *Proquest* menggunakan kata kunci ciprofloxacin AND (ear drop OR ototopical OR topical) AND chronic suppurative otitis media. Pada database lain, yaitu *Cochrane Library* dan *EBSCO HOST* menggunakan kata kunci ciprofloxacin AND chronic suppurative otitis media AND randomized controlled trial. Di tahap kedua, judul dan abstrak ditinjau berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah artikel penelitian yang telah dipublikasi pada jurnal internasional yang berkaitan dengan efektivitas siprofloxacin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik dengan database yang digunakan adalah *Google Scholar*, *Science Direct*, *Proquest*, *Springer Link*, *Cochrane Library*, dan *EBSCO HOST*; artikel penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2001–2020; tipe artikel penelitian *randomized controlled trial* (RCT); artikel penelitian yang dapat diakses secara penuh (*full text*); dan artikel berbahasa Inggris. Di tahap ketiga, kriteria eksklusi digunakan untuk menyaring artikel lebih lanjut. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara judul artikel dan abstrak. Pemeriksaan kesesuaian abstrak berdasarkan atas PICOS; artikel lengkap tidak dapat diakses; dan artikel yang duplikasi pada database lainnya. Artikel yang didapatkan dipilih berdasarkan atas kesesuaian dengan kriteria PICOS: *Population* (pasien dengan otitis media supuratif kronik), *Intervention* (pemberian antibiotik topikal golongan kedua fluorokuinolon, yaitu siprofloxacin), *Comparison* (kelompok yang diberi selain siprofloxacin topikal), *Outcome* (keberhasilan penggunaan siprofloxacin pada pengobatan otitis media supuratif kronik), dan *Study* (*Randomized Controlled Trial*).

Penilaian kualitas atau kelayakan pada penelitian ini didasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. Telaah kritis dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan *checklist* yang sesuai dengan jenis penelitian, yaitu *randomized controlled trial* (RCT) berdasarkan atas [https://joannabriggs.org/ebp/critical\\_appraisal\\_tools](https://joannabriggs.org/ebp/critical_appraisal_tools).

Semua data berupa artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria kelayakan yang di-review dan dianalisis secara kualitatif. Hasil keseluruhan artikel yang memenuhi syarat untuk di-review sebanyak 4 (empat) artikel.


## Hasil

Hasil pencarian data mengenai efektivitas siprofloxacin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik pada satu database, yaitu *Google Scholar* sebanyak 133 artikel, *Science Direct* sebanyak 133 artikel, *Proquest* sebanyak 150 artikel, *Springer Link* sebanyak 41 artikel, *Cochrane Library* sebanyak 20 artikel, dan *EBSCO HOST* sebanyak 88 artikel. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi sebanyak 344 artikel dan yang termasuk dalam kriteria eksklusi sebanyak 309 artikel. Hasil uji kelayakan berdasar atas PICOS sebanyak 4 artikel. Setelah dilakukan *critical appraisal* semua artikel dinyatakan layak juga sebanyak 4 artikel. Diagram PRISMA dapat dilihat pada Gambar 1.

Terdapat empat artikel penelitian yang telah di-review sebagai berikut.

*Comparison between the efficacy of topical ciprofloxacin with neomycin in the management of chronic suppurative otitis media.* (Siddique et al. 2020). Tujuan penelitian ini membandingkan efektivitas topikal siprofloxacin dengan neomisin pada pengobatan otitis media supuratif kronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian siprofloxasin topikal lebih efektif dibanding dengan topikal neomisin untuk mengontrol *discharge* dan kongesti pada otitis media supuratif kronik. Siprofloxasin dapat ditoleransi dengan baik dengan efek samping minimal sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa siprofloxasin dapat dianggap sebagai pilihan awal topikal antibiotik karena mempunyai spektrum yang luas dan profil efek samping rendah dengan toksitas minimal;<sup>20</sup>

*Effectiveness of ototopical antibiotics for chronic suppurative otitis media in Aboriginal children: a community-based, multicentre, double-blind randomised controlled trial* (Couzos et al. 2020). Tujuan penelitian ini adalah



membandingkan efektivitas siprofloxacin ototopikal (0,3%;siprofloxacin) dengan framisetin (0,5%), gramicidin, deksametason tetes telinga (5 tetes 2 kali sehari untuk 9 hari) bersamaan dengan *povidone-iodine* (0,5%) untuk membersihkan telinga sebagai pengobatan untuk otitis media supuratif kronik pada anak Aborigin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyembuhan OMSK terjadi pada 64% (siprofloxasin, 76,4% ;framisetin gramicidi-deksametason, 51,8%), dengan peningkatan yang signifikan pada kelompok siprofloxasin ( $P = 0,009$ , perbedaan absolut 24,6% [95% CI, 15,8–33,4%]). Pembersihan telinga sebanyak 2 kali sehari dan pengobatan siprofloxasin topikal lebih efektif pada penyembuhan otitis media supuratif kronik;<sup>21</sup>

*Topical ciprofloxacin versus topical framycetin-gramicidin-dexamethasone in Australian Aboriginal children with recently treated chronic suppurative otitis media* (Leach et al. 2018). Penelitian ini bertujuan membandingkan siprofloxasin topikal dengan *framycetin-gramicidin-dexamethasone* (FGD) topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyembuhan membran timpani terjadi pada satu dari 50 anak di kelompok siprofloxasin dan tidak satupun dari 47

anak dalam kelompok FGD mengalami penyembuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan siprofloxasin topikal lebih efektif dibanding dengan topikal *framycetin gramicidin-dexamethasone* (FGD) dalam proses penyembuhan otitis media supuratif kronik;<sup>22</sup>

*Topical quinolone vs. antiseptic for treating chronic suppurative otitis media: a randomized controlled trial* (Macfadyen et al. 2016). Penelitian ini bertujuan membandingkan antibiotik kuinolon topikal (siprofloxasin) dengan antiseptik topikal (asam borik) untuk pengobatan otitis media supuratif kronik pada anak. Hasil penelitian menunjukkan selama 2 minggu, *discharge* dapat dihilangkan pada anak yang diberi siprofloxasin dan anak yang diberikan asam borik. Efek ini juga signifikan pada waktu 4 minggu dan siprofloxasin dikaitkan dengan tanda pendengaran yang lebih baik pada kunjungan kedua.<sup>23</sup>

Hasil uji kelayakan artikel didapatkan bahwa dari 4 artikel yang di-review, semua artikel memiliki desain penelitian *randomized controlled trial*. Hasil *systematic review* efektivitas siprofloxasin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1 Hasil Systematic review: Efektivitas Siprofloxasin Topikal pada Pengobatan Otitis Media Supuratif Kronik**

No	Judul, waktu dan tempat	Tujuan	Desain Penelitian	Metode Pengukuran	Teknik Analisis	Hasil
1.	<i>Comparison between the efficacy of topical ciprofloxacin with neomycin in the management of chronic suppurative otitis media 2016. Combined Military Hospital (CMH), Peshawar</i>	Membandingkan efektivitas siprofloxasin topikal dengan neomisin pada pengobatan otitis media supuratif kronik	<i>Randomized controlled trial (RCT)</i> 186 Sampel Pada kelompok 1 diberikan obat tetes telinga siprofloxasin media supuratif (3 tetes Sipoteks) dan kronik pada kelompok 2 diberikan obat tetes telinga neomisin (3 tetes neosporin)	Pemeriksaan telinga pasien: tidak ada discharge, discharge	Chi square test dengan nilai $P < 0,05$ yang menunjukkan adanya perbedaan antara dan kongesti pada otitis pemberian siprofloxasin topikal dan neomisin topikal	Pemberian siprofloxasin topikal lebih efektif dibandingkan dengan topikal neomisin untuk mengontrol discharge pada kongesti pada otitis media supuratif kronik.
2.	<i>Effectiveness of ototopical antibiotics for chronic suppurative otitis media in Aboriginal children: a community-based, multicentre, double-blind randomised controlled trial 2003 Australia Utara</i>	membandingkan efektivitas siprofloxasin ototopikal (0,3%; (0,3%, Siloksan, CIP) dengan framisetin (0,5%), gramicidin, deksametason (5 tetes 2 kali sehari untuk 9 hari) bersamaan dengan <i>povidone-iodine</i> (0,5%)	<i>Randomized controlled trial (RCT)</i> 111 Sampel Siprofloxasin (Alcon Labs Pty Ltd) atau framisetin (0,5%), gramicidin dan deksametason (Sofradeks, Aventis Pharma Pty Ltd – 5 tetes 2 kali sehari selama 9 hari)	Otoskopi untuk melihat adanya otorrhea, pengambilan sampel discharge untuk pemeriksaan bakteriologi, mengukur perforasi membran timpani, dan dilakukan pure-tone audiometry.	Statistik Univariat Statistik Bivariat versi eksak $\chi^2$ -tipe tes. Hasil menunjukkan nilai $P < 0,05$ . Statistik Multivariat	pengobatan dengan siprofloxasin topikal lebih efektif pada penyembuhan otitis media supuratif kroni.

3. <i>Topical ciprofloxacin Untuk versus topical framycetin-gramicidin-dexamethasone in Australian Aboriginal children with recently treated chronic suppurative otitis media 2008 Australia</i>	<i>Randomized controlled trial (RCT) membandingkan siprofloksasin topikal dengan framycetin-dexamethasone (Siloksin) atau FGD (Sofradeks)</i>	<i>Diberikan 97 sampel Diberikan siprofloksasin topikal (Siloksin) atau FGD (Sofradeks)</i>	Pemeriksaan klinis dan mikrobiologi. Melihat adanya ottorhoea dan ukuran perforasi membran timpani.	Proporsi anak yang mengalami kegagalan peneyembuhan dengan FGD sekitar 90%.	Pengobatan dengan topikal siprofloksasin lebih efektif dibandingkan topikal FGD
4. <i>Topical quinolone vs. antiseptic for treating chronic suppurative otitis media: a randomized controlled trial 2005 District Kisumu, Kenya Barat</i>	<i>Randomized controlled trial (RCT) membandingkan antibiotik kuinolon topikal (siprofloksasin) dengan antiseptik topikal (asam borik) untuk pengobatan otitis media supuratif kronik pada anak</i>	<i>427 siprofloksasin (Ciloksan 0,3%; Alkon) atau dengan obat tetes telinga antiseptik (Asam borik 2% dalam 45% alkohol)</i>	Melihat adanya discharge, perforasi membran timpani, dan ambang batas pendengaran menggunakan pure-tone audiometry.	Person's chi-square dan ANCOVA	Pemberian topikal siprofloksasin lebih efektif dibandingkan dengan asam borik dan alkohol pada pengobatan otitis media supuratif kronik.

## Pembahasan

Berdasar atas 4 artikel yang telah di-review menunjukkan bahwa penggunaan siprofloksasin topikal lebih efektif dibanding dengan antibiotik topikal lain pada pengobatan otitis media supuratif kronik. Pasien otitis media supuratif kronik sering kali lebih merespons terhadap antibiotik yang bersifat topikal dibanding dengan sistemik. Antibiotik topikal menggunakan konsentrasi yang lebih besar pada jaringan yang ditargetkan dibanding dengan antibiotik sistemik.<sup>20</sup> Siprofloksasin merupakan generasi kedua kunionolon FDA yang disetujui untuk pengobatan OMSK pada orang dewasa. Siprofloksasin ototopikal memiliki keunggulan dibanding dengan neomisin karena memiliki pH 6,5 sehingga tidak mengganggu administrasi serta penyerapan sistemik. Siprofloksasin topikal menunjukkan kemungkinan induksi toksisitas sistemik rendah sehingga efek samping siprofloksasin topikal ringan. Pada penelitian Siddique *et al.* pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa tidak ada satu pasien pun yang mengeluh gangguan pendengaran yang berat, pusing, vertigo, mual, dan muntah selama atau setelah masa pengobatan.<sup>20</sup>

Menurut penelitian Kutz pada tahun 2013 kombinasi siprofloksasin dan deksametason dapat dijadikan pengobatan lini pertama *ottorhea* dengan perforasi membran timpani. Sediaan tersebut dapat membunuh dan melawan bakteri penyebab OMSK dan mengurangi pembentukan jaringan granulasi.<sup>24</sup> Penelitian lain yang menyatakan bahwa penggunaan siprofloksasin topikal lebih efektif. Pada tahun 2004 menerangkan bahwa profil keamanan obat untuk OMSK yang baik adalah jenis kuinolon dengan penggunaan ototopikal. Efek samping pada yang ditemukan pada lebih tinggi terkait dengan nyeri telinga, iritasi, dan pendarahan dengan penggunaan asam borik dalam alkohol. Hal ini dimungkinkan karena alkohol dapat menyebabkan rasa perih.<sup>23</sup>

Selain itu, JM juga pernah melakukan penelitian pada tahun 2000 yang mengungkapkan bahwa antibiotik topikal lebih unggul dari agen sistemik, apalagi topikal fluoroquinolon lebih efektif dibandingkan antibiotik topikal lainnya.<sup>20</sup>

*Pseudomonas aeruginosa* adalah patogen paling umum yang menyebabkan OMSK.<sup>3</sup> *Pseudomonas aeruginosa* ditemukan sekitar 22–44 % pada pasien OMSK. *Staphylococcus aureus* merupakan organisme tersering kedua pada 17–37% pasien OMSK.<sup>3</sup> *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* ditemukan di kulit liang telinga yang dapat berkembang karena kerusakan mukosa telinga tengah, peradangan, laserasi, atau kelembapan yang tinggi. Mikroorganisme ini dapat masuk ke dalam telinga bagian tengah melalui perforasi kronik.<sup>2</sup> Sejumlah uji klinis terhadap antibiotik kuinolon menunjukkan bahwa siprofloksasin memiliki aktivitas melawan *Pseudomonas aeruginosa* dengan angka kesembuhan yang tinggi. Antibiotik topikal kuinolon lebih efektif daripada antibiotik kuinolon sistemik saat pembersihan cairan setelah 1–2 minggu.<sup>22</sup> Mekanisme kerja siprofloksasin terhadap bakteri penyebab OMSK, yaitu masuk ke dalam sel bakteri melalui saluran porin dan menunjukkan efek antimikrob pada DNA girase (bakteri topoisomerase II) dan bakteri topoisomerase IV. Inhibisi topoisomerase IV berdampak pada stabilisasi kromosom selama pembelahan sel sehingga mengganggu pemisahan DNA yang baru direplikasi. Pada organisme gram negatif (misalnya, *Pseudomonas aeruginosa*) penghambatan DNA girase lebih signifikan daripada topoisomerase IV.<sup>17</sup>

Penelitian Uden *et al.* pada tahun 2018 menunjukkan antibiotik siprofloksasin memiliki resistensi sekitar 6,3–0,8% dan sensitivitas 92,1% terhadap *Pseudomonas aeruginosa*. Hal ini menunjukkan bahwa siprofloksasin efektif terhadap bakteri penyebab otitis media supuratif kronik.<sup>25</sup>

Keterbatasan penelitian ini adalah data penelitian

mengenai efektivitas siprofloksasin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik sangat terbatas. Keterbatasan lainnya, yaitu tidak dilakukan metaanalisis hanya dilakukan analisis secara kualitatif.

### Kesimpulan

Berdasar atas hasil pencarian data 4 artikel yang telah di-review, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan siprofloksasin topikal lebih efektif dibanding dengan antibiotik topikal, yaitu topikal neomisin, framisetin gramicidin-deksametason (FGD), dan asam aborik pada pengobatan otitis media supuratif kronik.

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasar atas penelitian yang dilakukan, penelitian lebih lanjut dengan metode *meta-analysis* dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman penggunaan siprofloksasin topikal pada pengobatan otitis media supuratif kronik.

### Konflik Kepentingan

Tim peneliti tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian ini.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan tim skripsi yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan artikel penelitian ini.

### Daftar Pustaka

1. Pasyah MF, Wijana. Otitis media supuratif kronik pada anak. GMHC. 2016;4(1):1.
2. Boesoarie SF, Mahdiani S, Yunard A, Aziza Y. Sistem indra T.H.T.K.L dan mata. Dalam: Mahdiani S, Dewi YA, penyunting. Otitis media supuratif kronis (OMSK). Edisi ke-1. Singapura. Elsevier; 2020. hlm. 321–33.
3. Mittal R, Lisi C V, Gerring R, Mittal J, Mathee K, Narasimhan G, dkk. Current concepts in the pathogenesis and treatment of chronic suppurative otitis media. J Med Microbiol. 2015;1103–16.
4. Neeff M, Biswas K, Hoggard M, Taylor MW. Molecular microbiological profile of chronic suppurative otitis media. J Clin Microbiol. 2016 Oct;54(10):2538–46.
5. Adler BC. Book review: Logan turner's diseases of the nose, throat and ear., Annals Otol Rhinol Laryngol. 1969;78:1317.
6. Morris P. Chronic suppurative otitis media. Am Fam Physician. 2013;88(10):694–6.
7. Asroel HA, Siregar DR, Aboet A. Profil of patient with chronic suppurative otitis media. J Public Health Policy. 2010 July;7(17):567–71.
8. Dhingra PL, Dhingra Shruti DD. Disease of ear nose and throat & head and neck surgery. Dhingra, India: Elsevier; 2014.
9. Wahid FI, Khan A, Khan IA hma. Complications of chronic suppurative otitis media: challenge for a developing country. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 May;24(5):265–70.
10. Srivastava M, Tyagi S. Bacteriological profile of chronic suppurative otitis media and its clinical significance in rural area . J Otolaryngol. 2015;5(4):1–6.
11. Master A, Wilkinson E, Wagner R. Management of chronic suppurative otitis media and otosclerosis in developing countries. Otolaryngol Clin North Am [Internet]. 2018;51(3):593–605.
12. Soepardi EA, Iskandar N, Bashiruddin J, Restuti RD. Buku ajar ilmu kesehatan telinga hidung tenggorok kepala & leher. Edisi ke-7. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2018.
13. Mediawaty D, Widodo P, Ruspita DA. Efektivitas klinis ofloksasin topikal dibanding ciprofloksasin oral pada terapi otitis media supuratif kronik aktif. Med Hosp.2017 May;4(2):77–83.
14. Sharma PC, Jain A, Jain S, Pahwa R, Yar MS. Ciprofloxacin: review on developments in synthetic, analytical, and medicinal aspects. J Enzyme Inhib Med Chem. 2010;25(4):577–89.
15. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Farmakologi dasar & klinik. Edisi ke-12. New York: Mc Graw Hill; 2012.
16. Bennett PN, Brown MJ, Sharma P. Clinical pharmacology. Edisi ke-11.China: Elsevier; 2018.
17. Bridgeman MB, Dalal KS. Pharmacology. Edisi ke-6. China: Wolters Kluwer; 2015.
18. Farida Y, Oktaria D. Tatalaksana terkini otitis media supuratif kronis (OMSK). J Medula Unila.2016 Dec;6(180):1–3.
19. Wahida N, Kadriyan H, Aini SR. Perbedaan sensitivitas bakteri penyebab otitis media supuratif kronik terhadap antibiotik siprofloksasin dan klindamisin di poli THT RSUD Provinsi NTB. J Kedokt. 2016;5(2):1–6.
20. Siddique W, Hakeem A, Ashfaq K, Khan M, Gul AA. Comparison between the efficacy of topical ciprofloxacin with neomycin in the management of chronic suppurative otitis media. Pak Armed Forces Med J. 2016;66(2):235–40.
21. Couzos S, Lea T, Mueller R, Murray R, Culbong M. Effectiveness of ototopical antibiotics for chronic suppurative otitis media in Aboriginal children: a community-based, multicentre, double-blind randomised controlled trial. Med J Aust. 2003 Aug 18;179(4):185–90.
22. Leach A, Wood Y, Gadil E, Stubbs E, Morris P. Topical ciprofloxacin versus topical framycetin-gramicidin-dexamethasone in australian aboriginal children with recently treated chronic suppurative otitis media: a randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J. 2008;27(8):692–8.
23. Macfadyen C, Gamble C. Topical quinolone vs. antiseptic for treating chronic suppurative otitis media: a randomized controlled trial. Wiley Online Libr [Internet]. [diunduh 18 Oktober 2020 2020 Oct 18]. Tersedia dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-3156.2004.01368.x>
24. Kondzielewski Z. Treatment for otitis media. CMAJ. 2005;173(3):2399–405.